Boehringer Ingelheim recorre seis ciudades españolas para presentar Ubropen® a los veterinarios

Este nuevo producto contiene la dosis óptima de penicilina ante las mastitis por gérmenes de Gram positivos

10 de marzo de 2020.- Tras lanzar al mercado Ubropen®, Boehringer Ingelheim ha completado una ronda de presentaciones que le ha llevado a recorrer seis ciudades de toda España. El objetivo es dar a conocer a los veterinarios este nuevo producto para el tratamiento de las mastitis clínicas causadas por estafilococos o estreptococos sensibles a la penicilina en vacas en período de lactación.

Las presentaciones, que finalizaron el pasado 20 de febrero en la ciudad de Barcelona, han visitado Lugo, Madrid, Cantabria y Asturias.

Los eventos se han articulado en torno a charlas formativas en las que Marta Dalmases (Boehringer Ingelheim), Oriol Franquesa (QLLET), Anna Jubert (ALLIC), Susan Astiz (INIA) y Manuel Cerviño (BIAHE) trataron temas como las resistencias antibióticas, la visión desde la granja de la mastitis por Gram+, las herramientas de diagnóstico, el estudio de prevalencia de la mastitis por Gram+ y por qué lanzar ahora una penicilina para el tratamiento de esta enfermedad.

La dosis óptima de penicilina

Ubropen® 600 mg contiene la dosis óptima de penicilina. Una dosis que permite concentraciones por encima de la CMI durante 24 horas, con margen de seguridad suficiente para satisfacer la variabilidad individual o los cambios farmacocinéticos en infecciones intramamarias.

Administración cómoda y tratamiento adaptable

Ubropen® 600 mg es una suspensión oleosa que mejora la distribución del principio activo en comparación con las soluciones acuosas. Se trata de un producto específico y muy efectivo que contiene penicilina micronizada, con un tamaño medio de partícula <12 µm.

Permite una administración cómoda con una dosis diaria y una solución homogénea que no necesita mezclarse. Además, el sistema Flexicap facilita una inserción parcial segura de la cánula en el canal del pezón.

Ficha técnica de producto

Ubropen® 600 mg suspensión intramamaria para vacas en lactación. **Composición:** Cada jeringa intramamaria de 10 g contiene: Bencilpenicilina procaína (como monohidrato), 600 mg. **Especies de destino:** Bovino (vacas en lactación). **Indicaciones:** Tratamiento de las mastitis clínicas causadas por estafilococos o estreptococos sensibles a la penicilina en vacas en período de lactación. **Contraindicaciones:** No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas, a otras sustancias del grupo betalactámico, a la procaína o a algún excipiente. No usar en caso de infecciones por patógenos productores de β-lactamasa. **Gestación y lactancia:** Puede utilizarse durante la gestación, pero no durante el período seco. **Reacciones adversas:** Reacciones de hipersensibilidad a la penicilina o a la procaína como: edema; alteraciones dermatológicas como urticaria, angioedema o eritema, y choque anafiláctico. En caso de aparición de reacciones adversas, debe interrumpirse el tratamiento con el producto e iniciarse un tratamiento sintomático. **Posología:** Vía intramamaria. Administrar el contenido de una jeringa (equivalente a 600 mg de bencilpenicilina procaína (como monohidrato)) en cada cuarterón afectado de la ubre una vez al día, después del ordeño. El tratamiento debe mantenerse durante 3-5 días. Según la presentación clínica, puede ser también necesario el tratamiento parenteral. **Precauciones:** El uso de este producto en condiciones distintas a las recomendadas en su RCP puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la bencilpenicilina y disminuir la efectividad del tratamiento con otros antimicrobianos betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas), debido a la posibilidad de resistencias cruzadas. El uso del producto debe basarse en los resultados de una prueba de sensibilidad a antimicrobianos con bacterias aisladas del animal afectado. Si no es posible realizar esta prueba, el tratamiento debe basarse en información epidemiológica local acerca de la sensibilidad de las cepas habitualmente implicadas en las mastitis clínicas por estafilococos o estreptococos. Cuando se utiliza el producto, es preciso tener en cuenta las recomendaciones oficiales a nivel nacional y regional sobre el uso de antimicrobianos. **Tiempos de espera:** Leche: 6 días. Carne: 3 días. **Conservación:** Conservar a temperatura inferior a 25 °C. **Nº autorización:** 3490 ESP. **Presentación:** Caja con 20 jeringas de 10 g con 20 toallitas limpiadoras. **Titular:** Vetcare Oy. **Representante Local:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**