

"Levo ligado a este mundo desde que empecei a andar. Para min é unha forma de vida"



En vídeo

Dunha pequena localidade da provincia de Ávila, Hoyos del Collado, é David Hernández, gandeiro por tradición e por vocación. Tras traballar un tempo nun taller deuse conta de que o que de verdade lle enchía era a gandería da súa familia e deixou todo por dedicarse a ela. A día de hoxe suma un rabaño dunhas cen cabezas e neste capítulo de #YoSoyCampo comparte cales son os seus principais retos.

Sempre quixeches dedicarte á gandería?

A miña familia tivo animais toda a vida, aínda que non en gran cantidade como agora, porque antes non había tantos recursos.

O meu avó tiña vacas. Do meu avó pasaron ao meu pai, do meu pai a min e así sucesivamente os anos que poidamos seguir aguantando.

Eu estaba a traballar nun taller e deixei aquilo porque a min o que me enchía era isto. Levo ligado a este mundo desde que empecei a andar. Para min é unha forma de vida.

Como é a túa rutina como gandeiro?

Neste traballo non tes un día a día fixo, cunha ruta por así dicilo. Un día pódeste atopar unha cousa e ir ben e outro atópaste con outra e botas toda a xornada.

A que retos te estás enfrentando?

Os principais problemas que temos hoxe en día son, máis que nada, coa Administración, porque nos pon moitas trabas para todo. Nós, por exemplo, somos transhumantes e para subir e baixar de Extremadura obríganos a facer unha proba de saneamento de pel e, este ano, mesmo de sangue. Poñen dificultades para vender xatos, para todo... Non entenden que non podemos estar todos os días cercando estes animais en currais, máis que nada porque non somos tanta xente para poder movelos como queremos.

Como cambiou a profesión nestes últimos anos?

Cambiou bastante, a peor e a mellor. Antes había tres ou catro vacas en cada casa, que era o que se podía ter e, agora, con axudas e subvencións, pódense ter máis animais. Agora mesmo temos un cento máis ou menos.

Como ves o futuro e que lle dirías a unha persoa nova que queira dedicarse a isto?

O futuro é un pouco incerto polo que xa comentei, porque poñen moitas trabas, pero esperemos que se poida ir solucionando todo para poder ter un futuro un pouco mellor; se non, isto vaise acabar.

En sitios coma este, cada vez hai menos poboación. Na miña aldea non chegamos a trinta persoas e, se cada vez poñen máis problemas, a xente vaine deixando, vai desaparecendo e a xente nova non se inicia neste sector, porque non é rendible.

Con todo, hai mozos que se queren dedicar a isto, non moitos, non tantos como nos gustaría, pero si que van animándose. Iso si, necesitan ter axuda dos seus pais ou de familiares que xa teñan animais porque, se non, non é viable.

Se tivese que animar a alguén, diríalle que neste traballo agora mesmo tes moita liberdade, vas ao teu aire. Os problemas que vos comentei antes vanse levando, pero aquí o mellor é a comodidade e o pracer de estar a gusto aquí, na natureza, nunha paisaxe coma esta. Isto nunha cidade non o vas ter, non se pode comparar.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



**SU VIDA
DEPENDE DE TÍ.
TU NEGOCIO
DEPENDE DE ELLOS.**

**BOvisan®
diar**

**UNA SOLA DOSIS
PUEDE PROTEGER
A AMBOS.**



Bovisan® Diar, vacuna de 1 sola dosis, frente a diarreas neonatales de terneros, con una respuesta inmunitaria rápida y duradera.

PARA VACAS DE LECHE Y DE CARNE

BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT - test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT - test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA - Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **Adjuvante:** Montanida ISA 206 VG 1.6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 - 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. **Alimentación de calostro:** La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) - N° reg: 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

Virbac