

# “ESTAMOS LIBRES DE IBR Y BVD, PERO UTILIZAMOS LA VACUNA PARA PREVENIR Y PARA QUE LAS VACAS ESTÉN BIEN INMUNIZADAS”

**YOLANDA ALBA GAYO**

Veterinaria y socia de SAT Os Foros



## SAT OS FOROS

### Localización:

- **Animales de producción:** Álvare, A Pastoriza (Lugo)
- **Recría:** Aldurfe, Riotorto (Lugo)

N.º de socios: 4

N.º total de animales: 300

Vacas en ordeño: 160

**Producción actual:** 47 litros vaca/día

**Grasa:** 3,73 %

**Proteína:** 3,22 %

**Edad al primer parto:** 25 meses

**Intervalo entre partos:** 436 días

**Intervalo parto-primer inseminación:** 98 días

**Intervalo parto-inseminación fecundante:** 158 días

**Inseminaciones por preñez:** 2,6



En vídeo

### ► ¿Cuál es el programa de vacunación empleado en la explotación y qué protocolo seguís?

Nosotros, según los análisis que tenemos hechos por la ADS —hacemos sangrías en las novillas cada seis meses—, estamos libres de BVD, IBR, neospora y paratuberculosis. De todas formas, nosotros seguimos un programa vacunal con Hiprabovis Balance e Hiprabovis IBR Marker Live a consecuencia de que en algún momento tuvimos problemas respiratorios. Utilizar IBR y BVD es, en caso de que surja un problema, para poder atajarlo de un modo mucho más fácil y que fuese menos grave en el cómputo de la explotación, es decir, que tuviese menos virulencia y que las vacas estén inmunizadas ante un ataque externo, que, por mi experiencia, puede surgir.

### ► ¿Desde qué edad empezáis la vacunación con Hiprabovis IBR Marker Live e Hiprabovis Balance?

Vacunamos todo el rebaño a partir de los seis meses de edad. Las novillas que nunca fueron vacunadas se revacunan a los 21 días de la primera dosis.

### ► ¿Observáis problemas reproductivos originados por los virus IBR o BVD?

Según expliqué antes, estamos libres de IBR y BVD en este momento, así que no, pero utilizamos la vacuna para prevenir y para que las vacas estén bien inmunizadas ante una posible agresión.

### ► ¿Tenéis problemas importantes por casos de neumonía en las terneras de cría?

No, no hay problemas importantes. Yo pienso que también influye que al estar vacunadas con Hiprabovis Balance tanto del virus sincitial como de parainfluenza están bien protegidas, entonces los anticuerpos calostrales dan inmunidad a las terneras y no tenemos problemas considerables ni graves en esta explotación.

### ► ¿Recomiendas la vacunación frente a los cuatro virus incluidos en vuestro programa vacunal para el control de su impacto tanto a nivel reproductivo como respiratorio?

Sí que la recomiendo, sin lugar a dudas. Ya lo expliqué antes, tanto si hay problemas reproductivos de IBR y BVD como si hay problemas respiratorios. A mi modo de ver, según mi experiencia clínica, es fundamental en una explotación tener controlados estos cuatro virus.



La **Referencia**  
en **Prevención**  
para **Salud Animal**