

"Como veterinarios, debemos estar preparados para apoiar os produtores no que necesiten"



En vídeo

A infancia de Laura Hurtado foi clave para determinar a súa vocación e a súa paixón pola profesión. A actual veterinaria e controladora gozaba dos veráns na vila xunto aos seus avós, época na que viviu experiencias e momentos que a marcaron profundamente. Nesta nova entrega de #YoSoyCampo contáanos como é o seu día a día e como foi cambiando o sector ao longo dos anos.

Sempre quixeches ser veterinaria?

Esa é a pregunta que a todos nos fixeron de nenos: "Que queres ser de maior?". Cando esa pequena Laura quería responder, deixábase aconsellar por aquilo que lle dicían de "fai o que che gusta". Para min era moi fácil, porque as ciencias da natureza me fascinaban. Ademais, a miña vocación polo campo vén marcada pola miña vida na vila. Por todos os veráns que pasaba xunto aos meus avós, nos que collía a bicicleta para buscar leña, ía con eles a por cogomelos, vía como levaban o coidado dos rabaños e como facían queixo... Para min era unha experiencia moi bonita que sempre quería repetir.

Como é o teu traballo diario?

O noso día a día é moi diverso, entón non nos aburrimos para nada. Traballamos con ruminantes, sobre todo con vacas de leite: facemos a parte de calidade de leite, xestionamos asociacións de control leiteiro e participamos no asesoramento en xenética. Polo tanto, a rutina varía: pode ser que me vaia toda unha mañá ou todo un día, ou que teña que estar oito horas nun foso recollendo mostras porque necesito esa información para a graxa, a proteína e as células somáticas. Con iso, podo orientar o gandeiro sobre a calidade e axudarlle a melloralas. Ademais, recolemos moita información dos partos, baixas, inseminacións, rexistros... Así, creamos unha árbore xenealóxica da gandería e formamos un pedigree, co cal, unido a novas ferramentas, podemos facer propostas en canto a que animais interesa que teñan descendencia na explotación, é dicir, o que sería o asesoramento en xenética.

Que é o que máis che gusta da túa profesión?

Poder estar ao lado do sector primario, que ao final é o que a todos nos dá de comer e nos abastece, tanto a agricultura como a gandería. Ademais, podo axudar moitísimo a pé de granxa. No meu caso sería incapaz de imaxinarme un traballo no que tivese que ir todos os días ao mesmo sitio e estar entre as mesmas catro paredes. A pesar de que a rutina é máis ou menos sempre similar, ves caras moi diferentes que acaban sendo recorrentes e que terminan formando parte da túa familia.

Como cambiou a profesión respecto a cando empezaches?

Eu levo oito anos no sector e si que vexo que as tecnoloxías crecen cada vez máis, a unha velocidade de vertice. Entón, tócame acompañar os gandeiros: tes que estar á altura, entender como usar esas tecnoloxías para poder axudarlles a coñecer que apartados deben manexar e a comprender como funciona todo o conxunto. Realmente, son persoas que contan con altas capacidades, porque non todo o mundo é capaz de saber de nutrición, de reprodución, de xenética, de manexo de tractores e de persoal... Teñen que entender de todo, e nós, como veterinarios, debemos estar preparados para apoiar os produtores no que necesiten.

Que lle dirías a unha persoa que se acaba de licenciar que ten dúbidas sobre que rumbo tomar?

A un futuro profesional que, do amplo abanico de posibilidades dispoñible, non sabe a que dedicarse, incitaríao a que formase parte da veterinaria de campo, porque seguro que non se volvería a aburrir nunca máis, xa que todos os días son diferentes e unha aventura nova: vas ir dunha explotación a outra e, se desfrutas de conducir, gozarás dos cambios de paisaxe e de estación.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



SU VIDA DEPENDE DE TÍ. TU NEGOCIO DEPENDE DE ELLOS.

BOvisan®
diar

UNA SOLA DOSIS PUEDE PROTEGER A AMBOS.



Bovisan® Diar, vacuna de 1 sola dosis, frente a diarreas neonatales de terneros, con una respuesta inmunitaria rápida y duradera.

PARA VACAS DE LECHE Y DE CARNE

BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina $\geq 44.8 \%$ de inhibición (ELISA)*** *VNT - test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT - test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA - Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adjuvante: Montanida ISA 206 VG 1.6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 - 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciben una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) - N° reg: 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

