

Pasión por el rural que se transmite de generación en generación



En vídeo

Los hermanos Capón, veterinarios de formación y ganaderos desde siempre, protagonizan esta nueva entrega de #YoSoyCampo. Águeda decidió hace seis años tomar las riendas de la granja familiar, Capón Holstein SC, junto con su marido, Miguel. Por su parte, Roi lleva trabajando en la cooperativa Aira también desde hace seis años. Ambos comparten su amor por las vacas.

Los inicios de Capón Holstein SC se remontan a los abuelos de Águeda y Roi. "Esta ganadería era de mis abuelos, que tenían vacas de carne. Cuando mi padre cumplió 16 años continuó con la explotación, pero se cambió a las de leche. Hace seis años mi pareja y yo nos hicimos cargo de la granja, ya que es nuestra vocación y nuestra vida", narra Águeda.

Desde pequeños, comenzaron a formarse y a competir en concursos de manejo y pelado tanto a nivel nacional como internacional, donde lograron títulos de gran relevancia. Águeda relata que "tuve la oportunidad de participar en el certamen europeo de Bruselas dos veces. En una ocasión conseguimos el premio de mejor grupo de Europa y Canadá y yo fui la mejor joven preparadora de Europa".

Tanto Roi como Águeda estudiaron Veterinaria. Águeda ejerció la profesión durante un tiempo hasta que, finalmente, se puso al frente del negocio familiar: "Yo siempre tuve claro que quería estudiar Veterinaria, pero con la meta final de tener mi propia granja. La verdad es que me siento una afortunada porque me dedico a lo que toda mi vida soñé. Me gusta todo: estar con los animales, disponer del tiempo de la manera en que yo quiero..."

En el caso de Roi, también tenía clara su vocación: "En esa época lo hablaba mucho con mi madre y le decía: 'Si no soy veterinario de vacas, ¿qué voy a hacer?' No contemplaba otra alternativa". Durante los últimos años de

universidad ya comenzó a hacer prácticas en Aira. Posteriormente, estuvo dos años trabajando en Asturias y hace seis que volvió a su localidad natal por circunstancias personales, momento en el que inició su trayectoria en Aira, donde continúa a día de hoy.

Roi admite que lo que más disfruta de su día a día, además de estar con las vacas, es el trato con la gente: "Los ayudo a vivir un poco mejor, ya no solo a nivel económico, sino que intento que tengan más descanso y su rebaño esté mejor. Asimismo, creo que se desconoce el hecho de que las condiciones de trabajo en el campo actualmente son muy buenas. Tuvimos a mucha gente de prácticas que se sorprendía de manera positiva con las labores que hacemos", cuenta Roi.

Los hermanos coinciden en que el sector primario es indispensable. "La población mundial está creciendo y va a haber que abastecer de comida a muchísima gente", asegura Roi Capón, que añade que de este modo se ayuda a fijar población en el rural.

Con respecto a la siguiente generación de la familia Capón, Águeda y Miguel ya tienen dos hijos pequeños a quienes les darán a conocer el amor pleno que sienten en su familia por el mundo ganadero y las vacas: "Nos gustaría que comprendieran la importancia que tiene este sector y que valoren lo que hace falta trabajar para tener en el supermercado un cartón de leche", concluye Águeda.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



Conoce el adyuvante que marca la diferencia

MONTANIDE ISA 206 VG, PARA EL DESARROLLO DE UNA INMUNIDAD RÁPIDA Y DURADERA



Úsalo las veces que necesites durante los 10 días siguientes a su apertura

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPARATIVA DEL MONTANIDE FRENTE A OTROS ADYUVANTES



VISITA AQUÍ EL VIDEO SOBRE EL MODO DE ACCIÓN DE MONTANIDE



BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA – Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adjuvante: Montanide ISA 206 VG 1.6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 – 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) – N° reg: 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd –Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

